

# 피를 묽게 하는 약을 복용하고 있는 분에게

복용하시는 약에 따라 지혈이 어려운 경우가 있기 때문에,  
예진표로 약의 종류를 체크하고 있습니다.  
백신 접종은 가능하지만, 접종 후 출혈에 주의가 필요합니다.

## 접종(근육주사)시 주의할 점

**! 접종 후에는 2분 이상 꼭 눌러주십시오.**

- 팔이 붓거나 저리는 등의 증상이 나타나면 의사와 상담하십시오.
- 접종에 있어서 약의 복용을 중단할 필요는 없습니다.

해당약

## 항응고제

부정맥, 혈전증, 심장수술 후 처방되는 경우가 많은 약입니다.

상품명	성분명
와파린	와르파린 칼륨
프라닥사	다비가트란
자렐토	리바록사반
엘리퀴스	에픽사반
릭시아나	에독사반토실산염수화물

피를 묽게 하는 약에는 다음과 같은 약도 있으나,  
정상적으로 접종하실 수 있습니다.

## 항혈소판제 등

동맥경화, 협심증·심근경색, 뇌졸중 후, 하지동맥폐색증으로 처방되는 경우가 많은 약입니다.

상품명	성분명	상품명	성분명
바이아스피린	아스피린	컴플라빈 배합정	아스피린·클로피도그렐황산염
파날딘	티클로피딘염산염	타켈다 배합정	아스피린·란소프라졸
플라빅스	클로피도그렐황산염	에파데일	이코사페트산에틸(EPA)
에피엔트	프라수그렐염산염	도너, 프로셀린	베라프로스트나트륨
프레탈	실로스타졸	안플라그	사포그릴레이트염산염
버퍼린	아스피린·다이알루미네이트배합제		
브릴린타	티카그렐러		