

هيا نتلقى التطعيمات!



■ المطلوبات عند التطعيم

- دليل صحة الأم والطفل

- استمارة الفحص المسبق

نوزعكم استمارة الفحص المسبق عند زيارتنا المنزل بها أطفال رضع ما يسمى (كونيتشيوا أكاتشان (こんにちは赤ちゃん訪問)، كما نوزعها في المؤسسة الطبية وقسم الصحة والرعاية الطبية ومكتب فرع البلدية (إلا فرع مدينة فوكوتومي).

■ قبل الحصول على التطعيم

يرجى تحديد موعد التطعيم بما يتناسب مع عمر أطفالكم وحالتهم صحة. (يرجى مراجعة الجهة الخلفية من الورقة)

يرجى الحصول على التطعيمات بعد قراءة دليل التطعيمات (التطعيم وصحة الأطفال 予防接種と子どもの健康) التي توزعها البلدية، والتأكد من فعاليتها والآثار الجانبية والملاحظات الأخرى.



نسخة - السنة المالية

■ يمكن بالقيام بالإجراءات إلكترونياً في حالة الحصول على التطعيمات خارج مدينة هيغاشي هيروشيما

عبر موقع الإنترنت!

يجب القيام بالإجراءات مسبقاً

الرجاء القيام بالإجراءات عبر موقع الإنترنت أو في مكتب قسم الصحة والرعاية الطبية أو في مكاتب فروع البلدية (إلا فرع مدينة فوكوتومي) قد تستغرق أسبوعاً أو أسبوعين لتم الإجراءات. إذا تلقيت التطعيم خارج المدينة، فقد تتحمل تكاليف على حساب الخاص.



يرجى مراجعة الموقع التالي للحصول على تفاصيل التطعيمات

خارج المدينة، وقائمة المؤسسات الطبية وإلخ



كيفية الحصول على التطعيمات الدورية
بموقع مدينة هيغاشي هيروشيما

【 جهة الاتصال للاستفسار 】

قسم الصحة والرفاه - شؤون الطبية والرعاية الصحية مدينة هيغاشي هيروشيما

رقم هاتفي (082)420-0936 فاكس (082)422-2416

سايجيو ساكاتاماتسي 8-29 مدينة هيغاشي هيروشيما 739-8601

أيام الأسبوع العادية من 8:30 إلى 17:15

مكتب فرعي كوروسي قسم الصحة والرفاه (082)382-0220

مكتب فرعي تويوساكا قسم تنمية المناطق (082)432-2563

مكتب فرعي كوتسي قسم تنمية المناطق (082)437-1109

مكتب فرعي أكيتسو قسم الصحة والرفاه 0846-45-2065

التطعيمات الدورية

(إذا كان الطفل ضمن الفئة العمرية المستهدفة للتطعيم، فيكون التطعيم مجانياً)



"نونقا" التيممة السياحية
لمدينة هيفاشي هيروشينا

بموجب " قانون التطعيم" تحدد التطعيمات الوقائية، حيث يتم تحديد أنوانها والفئات المستهدفة وفترات التطعيم. وتركز بشكل أساسي على الوقاية الجماعية والوقاية من الأمراض الخطيرة. يُنصح بتلقيها قدر الإمكان، ويقع على عاتق الشخص (أو ولي الأمر) واجب السعي لذلك. فلنحرص على أخذ التطعيم في الفترة الموصى بها قدر المستطاع.

ملاحظات	الفترة الفاصلة بين الجرعات	عدد الجرعات	الفترة الموصى بها للتطعيم	العمر المستهدف	اسم التطعيم
لا يشمل التطعيم المواليد لأمهات تم العثور على مستضد HBS داخل أجسادهن، والمواليد الذين تلقوا لقاح التهاب الكبد B (مع الغلوبولين المناعي لمستضد HBS).	أكثر من 27 يوماً	مرتين الجرعة الأولى	من عمر شهرين إلى أقل من عمر 9 أشهر	أقل من سنة واحدة	التهاب الكبد B
أكثر من 139 يوماً من الجرعة الأولى	مرة واحدة	جرعة إضافية			
أكثر من 27 يوماً	مرتين		من عمر شهرين إلى عمر 24 أسبوع (يجب أن تتم الجرعة الأولى من التطعيم قبل بلوغ 14 أسبوعاً و 6 أيام بعد الولادة)	من 6 أسابيع (0 يوم) بعد الولادة إلى 24 أسبوع (0 يوم) بعد الولادة	روتاريكس أحادي التكافؤ
أكثر من 27 يوماً	ثلاث مرات		من عمر شهرين إلى 32 أسبوع (يجب أن تكون الجرعة الأولى من التطعيم قبل بلوغ 14 أسبوعاً و 6 أيام بعد الولادة)	من 6 أسابيع (0 يوم) بعد الولادة إلى 32 أسبوع (0 يوم) بعد الولادة	روتاتيك خماسي التكافؤ
يختلف عدد الجرعات حسب عمر بدء التطعيم. يرجى مراجعة دليل التطعيمات الذي توزعه البلدية بعنوان "التطعيمات وصحة الأطفال 予防接種と子供の健康".	أكثر من 27 يوماً (حتى عمر 12 شهراً)	ثلاث مرات الجرعة الأولى	يبدأ التطعيم بين عمر شهرين وعمر أقل من 7 أشهر	من عمر شهرين إلى أقل من 5 سنوات	المكورة الروية للرضع
يترك فاصل لا يقل عن 60 يوماً بعد الانتهاء من الجرعة الأولى، ويعطى التطعيم بين عمر 12 شهراً وأقل من 15 شهراً	مرة واحدة	جرعة إضافية	من عمر 12 شهراً إلى 15 شهراً		
أكثر من 20 يوماً	ثلاث مرات	الجرعة الأولى بالمرحلة الأولى	من عمر شهرين إلى أقل من 7 أشهر	من عمر شهرين إلى أقل من 7 سنوات و 6 أشهر	الدفتيريا السعال الديكي الكزاز شلل الأطفال الهيبي (لقاح خماسي)
أكثر من 6 أشهر بعد الانتهاء من الجرعة الأولى	مرة واحدة	جرعة إضافية بالمرحلة الأولى	بعد انتهاء من الجرعة الأولى من المرحلة الأولى، تترك فترة فاصلة من 6 أشهر إلى سنة ونصف	من 11 سنوات إلى أقل من 13 سنة	
—	مرة واحدة	المرحلة الثانية (DT)	11 سنة		
—	مرة واحدة		من عمر 5 أشهر إلى أقل من 8 أشهر	أقل من سنة واحدة	BCG
—	مرة واحدة	المرحلة الأولى	من سنة واحدة إلى أقل من سنتين	من سنة واحدة إلى أقل من سنتين	الحصبة والحصبة الألمانية (MR)
—	مرة واحدة	المرحلة الثانية	السنة التي تسبق الالتحاق بالمدرسة الابتدائية (من 1 أبريل إلى 31 مارس)	من 5 سنوات إلى أقل من 7 سنوات في السنة التي تسبق دخول إلى المدرسة الابتدائية	
أكثر من 3 أشهر (عادة يكون الحد الأقصى بين 6 أشهر و 12 شهراً)	مرتين		من سنة واحدة إلى أقل من سنة و 3 أشهر	من سنة واحدة إلى أقل من 3 سنوات	الحماق جدري الماء
أكثر من 6 أيام (عادة يكون الحد الأقصى 28 يوماً)	مرتين	الجرعة الأولى بالمرحلة الأولى	3 سنوات	من عمر 6 أشهر إلى أقل من 7 سنوات و 6 أشهر	التهاب الدماغ الياباني
أكثر من 6 أشهر بعد الانتهاء من الجرعة الأولى (عادة بعد سنة واحدة تقريباً)	مرة واحدة	جرعة إضافية بالمرحلة الأولى	4 سنوات		
—	مرة واحدة	المرحلة الثانية	من 9 سنوات إلى 10 سنوات	من 9 سنوات إلى أقل من 13 سنة	

التطعيمات الوقائية الاختيارية

ملاحظات	الفترة الفاصلة بين الجرعات	عدد الجرعات	الفترة الموصى بها للتطعيم	العمر المستهدف	اسم التطعيم
بالنسبة للقاح ثنائي التكافؤ ولقاح الرباعي التكافؤ أو التطعيمات التعويضية، يرجى الاطلاع على هذا الموقع	أكثر من 5 أشهر (عادة بعد 6 أشهر)	مرتين	(تُعطى الجرعة الأولى قبل سن 15 عاماً)	الفئات في الصف السادس الابتدائي إلى ما يعادل الصف الأول الثانوي	اللقاح الرباعي (تساعي التكافؤ)
	يعطى الجرعة الثانية بعد مرور شهر واحد على الأقل منذ الجرعة الأولى (عادة بعد شهرين من الجرعة الأولى)		(تُعطى الجرعة الأولى قبل سن 15 عاماً)		
	يعطى الجرعة الثالثة بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل منذ الجرعة الثانية (عادة بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى)		ثلاث مرات		

* بالنسبة للتطعيمات الوقائية غير المدرجة في القائمة مثل اللقاح الرباعي أو لقاح هيب، يرجى استشارة قسم الصحة الطبية والرفاه أو المؤسسة الطبية.

ملاحظات	الحد الأقصى لمبلغ الإعانة	العمر المستهدف	اسم التطعيم
للمزيد من التفاصيل من هنا	6,000 ين (*لمرة واحدة فقط) (قد يكون هناك رسوم يتحملها على حساب الخاص حسب المؤسسة الطبية)	من سنة واحدة إلى أقل من سنتين	النكاف