

# هيا نتلقى التطعيمات!



## ■ المطلوبات عند التطعيم

- دليل صحة الأم والطفل

- استمارة الفحص المسبق

نوزعكم استمارة الفحص المسبق عند زيارتنا المنزل بها أطفال رضع ما يسمى (كوننيتشيوا أكاتشان (こんにちは赤ちゃん訪問)، كما نوزعها في المؤسسة الطبية وقسم الصحة والرعاية الطبية ومكتب فرع البلدية (إلا فرع مدينة فوكوتومي).

## ■ قبل الحصول على التطعيم

يرجى تحديد موعد التطعيم بما يتناسب مع عمر أطفالكم وحالتهم صحة. (يرجى مراجعة الجهة الخلفية من الورقة)

يرجى الحصول على التطعيمات بعد قراءة دليل التطعيمات (التطعيم وصحة الأطفال (予防接種と子どもの健康) التي توزعها البلدية، والتأكد من فعاليتها والآثار الجانبية والملاحظات الأخرى.



نسخة \_ \_ \_ \_ \_ السنة \_ \_ \_ \_ \_ المالية

يمكن بالقيام بالإجراءات إلكترونياً ■ في حالة الحصول على التطعيمات خارج مدينة هيغاشي هيروشيما

عبر موقع الإنترنت!

## يجب القيام بالإجراءات مسبقاً

الرجاء القيام بالإجراءات عبر موقع الإنترنت أو في مكتب قسم الصحة والرعاية الطبية أو في مكاتب فروع البلدية (إلا فرع مدينة فوكوتومي) قد تستغرق أسبوعاً أو أسبوعين لتم الإجراءات. إذا تلقيت التطعيم خارج المدينة، فقد تتحمل تكاليف على حساب الخاص.



يرجى مراجعة الموقع التالي للحصول على تفاصيل التطعيمات

خارج المدينة، وقائمة المؤسسات الطبية والخ

【 جهة الاتصال للاستفسار 】  
قسم الصحة والرفاه - شؤون الطبية والرعاية الصحية مدينة هيغاشي هيروشيما

رقم هاتفي (082)420-0936 فاكس 2416- (082)422

سايجيو ساكائيماتسي 8-29 مدينة هيغاشي هيروشيما 739-8601

أيام الأسبوع العادية من 8:30 إلى 17:15

مكتب فرعي كوروسي قسم الصحة والرفاه (082)382-0220

مكتب فرعي تويوساكا قسم تنمية المناطق (082)432-2563

مكتب فرعي كوتسي قسم تنمية المناطق (082)437-1109

مكتب فرعي أكيتسو قسم الصحة والرفاه 0846-45-2065



كيفية الحصول على التطعيمات الدورية  
بموقع مدينة هيغاشي هيروشيما

## التطعيمات الدورية

(إذا كان الطفل ضمن الفئة العمرية المستهدفة للتطعيم، فيكون التطعيم مجانياً)

بموجب " قانون التطعيم " تحدد التطعيمات الوقائية، حيث يتم تحديد أنواعها والفئات المستهدفة وفترات التطعيم. فلنحرص على أخذ التطعيم في الفترة الموصى بها قدر المستطاع.



"نونتا" التهيئة السياحية  
لمدينة هيغاشي هيروشيما

اسم التطعيم	العمر المستهدف	الفترة الموصى بها للتطعيم	عدد الجرعات	الفترة الفاصلة بين الجرعات	ملاحظات
التهاب الكبد B	أقل من سنة واحدة	من عمر شهرين إلى أقل من عمر 9 أشهر	الجرعة الأولى مرتين	أكثر من 27 يوماً أكثر من 139 يوماً من الجرعة الأولى	لا يشمل التطعيم المواليد لامهات تم العثور على مستضد HBS داخل أجسادهن، والمواليد تلقوا لقاح التهاب الكبد B (مع الغلوبولين المناعي لمستضد HBS).
روتاريكس أحادي التكافؤ	من 6 أسابيع (0 يوم) بعد الولادة إلى 24 أسبوع (0 يوم) بعد الولادة	من عمر شهرين إلى عمر 24 أسبوع (يجب أن تتم الجرعة الأولى من التطعيم قبل بلوغ 14 أسبوعاً و6 أيام بعد الولادة)	مرتين	أكثر من 27 يوماً	هذا لقاح فموي. يتم اختيار نوع واحد فقط من الاثنين لأخذ التطعيم.
	من 6 أسابيع (0 يوم) بعد الولادة إلى 32 أسبوع (0 يوم) بعد الولادة	من عمر شهرين إلى 32 أسبوع (يجب أن تكون الجرعة الأولى من التطعيم قبل بلوغ 14 أسبوعاً و6 أيام بعد الولادة)	ثلاث مرات	أكثر من 27 يوماً	
المكورة الرؤوية للرضع	من عمر شهرين إلى أقل من 5 سنوات	يبدأ التطعيم بين عمر شهرين وعمر أقل من 7 أشهر من عمر 12 أشهر إلى 15 أشهر	الجرعة الأولى مرتين	أكثر من 27 يوماً *حتى عمر 12 أشهر يجب ترك فاصل لا يقل عن 60 يوماً بعد الانتهاء من الجرعة الأولى، وذلك بعد بلوغ العمر سنة واحدة	يختلف عدد الجرعات حسب عمر بدء التطعيم. يرجى مراجعة دليل التطعيمات الذي توزعه البلدية بعنوان "التطعيمات وصحة الأطفال 予防接種と子供の健康".
الدفتيريا السعال الديكي الكرزاز شلل الأطفال التهاب (لقاح خماسي)	من عمر شهرين إلى أقل من 7 سنوات و6 أشهر من 11 سنوات إلى أقل من 13 سنة	من عمر شهرين إلى أقل من 7 أشهر بعد انتهاء من الجرعة الأولى من المرحلة الأولى، تترك فترة فاصلة من 6 أشهر إلى سنة ونصف 11 سنة	الجرعة الأولى بالمرحلة الأولى جرعة إضافية بالمرحلة الأولى المرحلة الثانية (DT)	أكثر من 20 يوماً أكثر من 6 أشهر بعد الانتهاء من الجرعة الأولى —	في المرحلة الثانية، يتم تلقي لقاح مزدوج ضد الدفتيريا والتيتانوس (DT).
BCG	أقل من سنة واحدة	من عمر 5 أشهر إلى أقل من 8 أشهر	مرة واحدة	—	هذا لقاح للوقاية من مرض السل.
الحصبة والحصبة الألمانية (MR)	من سنة واحدة إلى أقل من سنتين من 5 سنوات إلى أقل من 7 سنوات في السنة التي تسبق دخول إلى المدرسة الابتدائية	من سنة واحدة إلى أقل من سنتين السنة التي تسبق الالتحاق بالمدرسة الابتدائية (من 1 أبريل إلى 31 مارس)	المرحلة الأولى المرحلة الثانية	مرة واحدة مرة واحدة	بالنسبة لأولئك الذين لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح بسبب نقص الإمدادات في عام 2024، يمكنهم تلقيه كجزء من التطعيمات الدورية حتى نهاية مارس 2027.
الحماق جدري الماء	من سنة واحدة إلى أقل من 3 سنوات	من سنة واحدة إلى أقل من سنة و3 أشهر	مرتين	أكثر من 3 أشهر (عادة يكون الحد الأقصى بين 6 أشهر و12 شهراً)	
التهاب الدماغ الياباني	من عمر 6 أشهر إلى أقل من 7 سنوات و6 أشهر من 9 سنوات إلى أقل من 13 سنة	3 سنوات 4 سنوات من 9 سنوات إلى 10 سنوات	الجرعة الأولى بالمرحلة الأولى جرعة إضافية بالمرحلة الأولى المرحلة الثانية	أكثر من 6 أيام (عادة من 6 أيام إلى 28 يوماً) أكثر من 6 أشهر بعد الانتهاء من الجرعة الأولى (عادة بعد سنة واحدة تقريباً) —	[الأشخاص المؤهلون للاستثناء الخاص] الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً والذين فقدوا فرصة التطعيم بسبب التوقف عن توصيته، يمكنهم تلقي الجرعات الناقصة.
سرطان عنق الرحم (تساعي التكافؤ)	الفتيات في الصف السادس الابتدائي إلى ما يعادل الصف الأول الثانوي	في الصف الأول الإعدادي	(تُعطى الجرعة الأولى قبل سن 15 عاماً) (تُعطى الجرعة الأولى بعد بلوغ العمر سن 15 عاماً)	الفترة الفاصلة بين الجرعات أكثر من 5 أشهر (عادة بعد 6 أشهر)	يعطى الجرعة الثالثة بعد مرور شهر واحد على الأقل منذ الجرعة الأولى (عادة بعد شهرين من الجرعة الأولى) يعطى الجرعة الثالثة بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل منذ الجرعة الثانية (عادة بعد 6 أشهر من الجرعة الأولى)

عاماً) التطعيمات الاختيارية

اسم التطعيم	العمر المستهدف	الفترة الموصى بها للتطعيم	عدد الجرعات	ملاحظات
فيروس تنفسي محلوي بشري (لقاح مناعة الأم والطفل)	من 28 أسبوع (0 يوم) في الحمل إلى 36 أسبوع و6 أيام في الحمل	من 28 أسبوع (0 يوم) في الحمل إلى 36 أسبوع و6 أيام في الحمل	مرة واحدة لكل حمل	

اسم التطعيم	العمر المستهدف	الحد الأقصى لمبلغ الإعانة	ملاحظات
النكاف	من سنة واحدة إلى أقل من سنتين	7,000 ين (*لمرة واحدة فقط) (قد يكون هناك رسوم يتحملها على حساب الخاص حسب المؤسسة الطبية)	للمزيد من التفاصيل من هنا

\* بالنسبة للتطعيمات الوقائية غير المدرجة في القائمة مثل اللقاح الرباعي أو لقاح هيب، يرجى استشارة قسم الصحة الطبية والرفاه أو المؤسسة الطبية.